




« ЮНИЛАБ »
независимая лаборатория

Оценка риска рака предстательной железы

253301

	Данные пациента	m-sd	m+sd	m	sd
возраст	72	57,79	72,01	64,9	7,11
ПСА	12,41	5,12	8,48	6,80	1,68
св. ПСА	14,18%	5,03	21,57	13,3	8,27
Объем простаты	54,00	18,28	56,72	37,5	19,22
Пальцевое исследование	0	-0,1	0,9	0,4	0,5
Риск пациента (ANN, уровень патологических значений) spec. 95%	0,688				
cut-off	0,334				



Высокий риск

В результате математической обработки представленных на анализ данных, получены значения ANN (уровень патологического значения пациента) и cut-off (пороговое значение). В том случае, если ANN < cut-off следует считать, что риск низкий. Если ANN > cut-off, то риск расценивается как высокий

* Результат получен при помощи расчетов с учетом статистических вычислений и не может заменить рекомендации лечащего врача

24.04.2024 г.

Захарова Е.Н.

Е. Н. Захарова



Risk estimation for prostate cancer

patient: 254293
date: 24.04.2024

age [years] 72.0

total PSA [ng/ml] 12.40

%fPSA 14.18

prostate volume [ml] 54.0


DRE 0

ANN value of the patient **0.688** ↑

cut-off (Sens 95%) **0.334 "risk - biopsy recommended"**

The result is a statistical finding and does not replace the individual doctor's advice.

Total and free PSA tested with Beckman Access



With positive rectal examination
or with PSA greater
than 10 ng/ml a biopsy
is generally recommended.

Use of the ANN is
recommended only
in case of a repeat-biopsy.

Dr. H. Zakharenko

