

**ЮНИЛАБ**

www.unilab.su

Бесплатная консультация ВРАЧА  
по телефону 8-800-555-55-69

№ 269 1575 000

**ООО "ЮНИЛАБ-ВЛАДИВОСТОК"**

Единая справочная 8 (423) 224-21-24; otziv@unilab.su

Дата поступления биоматериала

14.08.2024 11:34

**СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ**

Место забора:

выдачи:

Ф.И.О.

Дата рождения (возраст):

Пол:

DS:

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Исследование	Результат	Ед. изм.	Дата готовности результата	Референтные пределы
--------------	-----------	----------	----------------------------	---------------------

Метод: ИФА

**Специфические иммуноглобулины класса IgG к различным пищевым аллергенам (пищевая непереносимость), 90 аллергенов, BIOMERICA, США**

Авокадо (f131)	17.72	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Коровье молоко (f2)	* 74.03	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Ананас (f72)	11.66	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона

Морковь (f31)	* 85.62	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Апельсин (f33)	* 61.20	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Дыня канталупа (un02)	* 65.36	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Арахис (f13)	2.49	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Мягкий сыр (f303)	41.80	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона

Баклажан (f176)	* 159.07	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Овес (g14)	* 109.40	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Банан (f29)	8.76	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Огурец (f133)	* 99.88	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Баранина (f88)	1.01	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона

Оливки (f122)	* 61.56	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Бета-лактоглобулин (f294)	2.33	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Орех колы (un03)	4.95	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Виноград (f50)	* 81.47	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Палтус (f196)	2.33	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона

Глютен (f79)	37.78	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Черный перец (s7)	9.79	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Говядина (f27)	0.49	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Перец чили (s29)	28.47	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Голубика (f229)	33.35	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона

Персик (f53)	* 74.56	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Грейпфрут (f92)	24.92	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Петрушка (f86)	* 56.96	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Грейкий орех (f16)	* 51.28	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Пшеница (f210)	* 90.84	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона

Гречневая крупа (f11)	* 269.34	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Пшено (f140)	5.32	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Грибы шампиньоны (un06)	0.52	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Пятнистая фасоль (un07)	44.46	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Груша (f30)	18.79	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона

Рис (f9)	* 57.07	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Дрожжи пекарские (f45)	1.56	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Рожь (f254)	* 69.12	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Дрожжи пивные (f43)	4.50	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Сардины (f160)	0.55	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона

Зеленый горошек (f12)	23.98	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Свекла (f136)	31.63	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Зеленый сладкий перец (un05)	* 73.98	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Свинина (f26)	10.13	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Земляника (f44)	37.73	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона

Сельдерей (f85)	48.92	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Индейка (f130)	1.96	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Семя подсолнуха (f114)	* 62.95	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Йогурт (f250)	17.64	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Слива (f148)	26.89	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона

Казеин (f295)	10.14	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Соевые бобы (f14)	29.14	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Кальмар (f161)	1.49	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Стручковая фасоль (f244)	* 91.95	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Камбала (f186)	0.39	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона

Брынза (un04)	44.89	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Капуста брокколи (f134)	20.66	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Сыр Чеддер (f81)	* 52.91	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Капуста кочанная (f39)	38.11	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Томаты (f25)	* 262.60	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона

Картофель (f35)	* 223.82	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Треска (f3)	3.06	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Кофе (f95)	1.81	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Тростниковый сахар (f270)	10.32	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Краб (f292)	2.47	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона

Тунец (f40)	6.06	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Креветки (f24)	0.42	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Тыква (f151)	* 116.34	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Кролик (f167)	1.57	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Устрицы (f177)	13.94	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона

Кукуруза (f74)	* 59.13	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Форель (f22)	2.41	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Кунжут (f10)	9.74	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Хек (f163)	1.46	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Табак (un11)	* 61.17	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона

Цветная капуста (f61)	3.43	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Курица (f83)	1.81	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Цельное зерно ячменя (g18)	15.38	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Лимон (f32)	39.59	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Черный чай (f99)	46.29	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона

Лосось (f41)	0.00	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Чеснок (f47)	* 65.94	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Лук (f48)	39.87	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Швейцарский сыр (f70)	40.59	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Масло сливочное (un01)	12.27	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона

Шоколад (f52)	6.50	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Мед (f277)	3.12	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Яблоко (f49)	* 60.63	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Миндаль (f20)	13.29	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Яичный белок (f1)	* 84.26	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона

Молоко козье (f219)	29.97	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона
Яичный желток (f75)	17.97	МЕ/мл	15.08.2024	(0.00 - 50.00) менее 50 - класс (0), отсутствие пищевой непереносимости; от 50 до 100 - низкая выраженность пищевой непереносимости, класс (1), рекомендуется ограничить употребление данного продукта, 1-2 раза в неделю; от 100 до 200 - умеренная выраженность пищевой непереносимости, класс (2), следует максимально ограничить употребление аллергена; более 200 - выраженная пищевая непереносимость, класс (3), следует исключить запрещенный продукт из рациона

Исполнители: Колганова И. В.

Заведующая лабораторией

*Пугачева*  
подпись

Пугачева Н.М.

Расшифровка подписи